تصحيح الاختبار التجريبي 2022-2023 شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول (5 نقاط):☺

1- عنون الوثيقة المرفقة ثم سم البيانات المرقمة من (1 الى 16) والآليتين (أ) و (ب) .

العنوان : رسم تخطيطي يوضح التكامل الوظيفي بين الآليتين الكيموضوئية والكيموحيوية بالصانعة الخضراء . 0.25

رقم البيان	1	2	3	4
اسم البيان	الضوء	الغرانا	غشاء الخارجي للصانعة الخضراء	الغشاء الداخلي للصانعة الخضراء
5	6	7	8	9
الفضوة بين الغشائين	H_2O	أكسجين	التلاكوئيد	CO_2
10	11	12	13	14
الجلوكوز أو HP أو PGal	الحشوة	$NADP^+$	ADP	Pi
15	16			
$NADPH ;H^+$	ATP			

المركب X	المركب Y	الآلية (أ)	الآلية (ب)
RDP	APG	المرحلة الكيموحيوية	المرحلة الكيموضوئية

2.5 — 20*0.125

2- اشرح في نص علمي مهيكل ومنظم آليات التفاعلات الكيموحيوية التي تحدث على مستوى الصانعات الخضراء انطلاقا مما تقدمه الوثيقة واعتمادا على معلوماتك.

المقدمة : تقوم النباتات الخضراء بظاهرة حيوية تدعى التركيب الضوئي مقرها الصانعات الخضراء وفق تسلسل جملة من التفاعلات الكيموحيوية بآليات دقيقة ومحددة . 0.25

المشكل : كيف تحدث آليات التفاعلات الكيموحيوية على مستوى الصانعات الخضراء ؟

التوسيع : تمر تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي بآليتين اساسيتين هما :

** تفاعلات الكيموضوئية : مقرها التلاكوئيد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية في نواتجها $12\ NADPH,H^+$ و $18\ ATP$. 0.25

** تفاعلات الكيموحيوية : مقرها الحشوة أين يتم إرجاع CO_2 إلى كربون عضوي باستعمال الطاقة الكيميائية ($NADPH,H^+$ و ATP) الناتجة عن المرحلة الكيموضوئية . 0.25

فتصبح الطاقة الكيميائية على مستوى المادة العضوية المركبة على هيئة روابط كيميائية .

التفاعلات المرحلة الكيموضوئية هي : 0.25

2.25

** الأكسدة الضوئية للماء :

$$12\ H_2O \xrightarrow{\text{ضوء}} 6O_2 + 24H^+ + 24é$$

** ارجاع المستقبل النهائي للإلكترونات 0.25

$$12\ NADP^+ + 24H^+ + 24é \xrightarrow{\text{انزيم NADP ريدوكتاز}} 12NADPH,H^+$$

** فسفرة ADP لتركيب ATP 0.25

$$18(ADP + Pi) \xrightarrow{\text{طاقة سيل البروتونات}} 18ATP$$

انزيم ATP سنتتاز

المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية : 0.25

$$12\ H_2O + 12\ NADP^+ + 18(ADP + Pi) \xrightarrow{\text{ضوء + انزيمات +اليخضور}} 6O_2 + 12NADPH,H^+ + 18(ADP + Pi)$$

	0.25	**التفاعلات المرحلة الكيموحيوية هي :** $6\ CO_2 + 12NADPH,H^+ + 18ATP \longrightarrow C_6O_{12}O_6 + 18(ADP + Pi) + 6H_2O + 12NADP^+$ 
	0.25	**الخاتمة :** أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين سلسلة التفاعلات الكيموضوئية و الكيموحيوية فيتم تحويل الطاقة الضوئية إلى الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية .

التمرين الثاني (7 نقاط):☺

1ـ تحليل منحنيي الشكلين (ج) و (د) من الوثيقة (2)

0.5	0.125 0.125 0.25	يمثل منحنى الشكل (ج) تغيرات نسبة نشاط أنزيم LDH بدلالة درجة الحموضة حيث نجد : ❖ عند PH=9 : تبلغ نسبة نشاط الإنزيم قيمة أعظمية تقدر بـ 95% . ❖ عند درجة الحموضة أقل من PH=9 أو أكبر من PH=9 تتناقص نسبة نشاط الإنزيم الى أن تكاد تنعدم عند PH=4 و PH=13 ومنه نستنتج أن نشاط الإنزيم LDH يتأثر بتغيرات درجة الحموضة . يعتبر PH=9 القيمة الأمثل لنشاط انزيم LDH .
0.5	0.125 0.125 0.25	يمثل منحنى الشكل (د) تغيرات نسبة نشاط أنزيم LDH بدلالة درجة الحرارة حيث نجد : ❖ في مجال درجة الحرارة [54-60°c] : تبلغ نسبة نشاط الإنزيم قيمة أعظمية تقدر بـ 95% . ❖ عند درجات الحرارة خارج هذا المجال أقل من 54°c و أكبر من 60°c تتناقص نسبة نشاط الإنزيم لتصل الى النسبة 15% عند الدرجة 20°c و 10% عند الدرجة 80°c . ومنه نستنتج أن نشاط الإنزيم LDH يتأثر بتغيرات درجة الحرارة . يعتبر مجال درجة الحرارة [54-60°c] القيم الأمثل لنشاط انزيم LDH .

2ـ تحديد خصائص أنزيم LDH .

0.5	0.125 0.125 0.125 0.125 0.125	✓ انزيم LDH ذو بنية رابعية به أربع سلاسل ببتيدية (A +B+C+D) بها بنيات ثانوية β و α بالإضافة إلى مناطق الانعطاف . ✓ كل سلسلة ببتيدية بها 331 حمض أميني ..... ✓ انزيم LDH يحفز تفاعل التحويل العكسي للركيزة البيروفات إلى الناتج اللاكتات في وجود $NAD^+/NADH,H^+$ ✓ نشاط الإنزيم LDH يتأثر بتغيرات درجة الحرارة ودرجة حموضة الوسط: - يعتبر مجال درجة الحرارة [54-60°c] القيم الأمثل لنشاط انزيم LDH . - يعتبر pH=9 القيمة الأمثل لنشاط انزيم LDH .

		لجزء الثاني:
		ـ باستغلالك لوثيقة (2) : ☜ 2 ـ شرح فاعلية الأنزيم عند pH = 13 و T°=80°c مقارنة بفاعليته عند درجة الحرارة والحموضة المثلى .
01	0.25 0.125 4⋆ 0.125 0.125	توضح الوثيقة 2) رسما تخطيطيا للموقع الفعال لأنزيم LDH الشكل (أ) حيث نجد: أن إنزيم LDH به تجويف صغير هو الموقع الفعال يضم مجموعة أحماض أمينية محددة متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائيا هي : His195 +Arg109+Arg171+Val138 + Gln102 + Asp 168 ⋆⋆ تثبت ركيزة البيروفات ومرافق الإنزيم NADH على الموقع الفعال للإنزيم LDH مشكلة معقد (إنزيم LDH ـ ركيزة) حيث : ⋆⋆ تنشأ رابطة انتقالية بين المجاميع الكيميائية للحمض الأميني Val138 و مرافق الإنزيم NADH . ⋆⋆ تنشأ رابطتين كيميائيتين هيدروجينية بين أوكسجين الركيزة بيروفات و الوظائف الأمينية الحرة للحمضين الأمينيين His195 و Arg109 المتأينين . ⋆⋆كما تنشأ رابطتين كيميائيتين بين الوظيفة الكربوكسيلية المتأينة بشحنة سالبة للركيزة بيروفات و المجاميع الأمينية الحرة المتأينة بشحنة موجبة للحمض الأميني Arg171 بالإضافة إلى رابطة هيدروجينية . ومنه نستنتج أن الموقع الفعال لإنزيم LDH يضم أحماض أمينية محددة خاصة بموقع التثبيت والاخرى خاصة بالتحفيز وهي His195 +Arg109+Arg171+Val138 . أما الأحماض الأمينية الأخرى منها Gln102 ، Asp 168 فتساهم في الشكل الفراغي للموقع الفعال ومنه البنية الفراغية لإنزيم LDH طبيعية متكاملة مع جزء من الركيزة لحدوث تفاعل التحفيز .
		فكيف يؤثر انزيم LDH على ركيزته البيروفات بوجود مرافق الانزيم NADH لتحرر النواتج لاكتات و NAD^+ ؟
0.625	0.125 5⋆	الاجابة يقدمها الشكل (ب) من الوثيقة (2) : يوضح آلية تحفيز إنزيم LDH : إذ يعمل الإنزيم على تحويل البيروفات الى اللاكتات في وجود NADH وذلك في درجة حرارة و pH المناسبتين لنشاطه وفق الخطوات التالية : ☜ بعد ارتباط مرافق الإنزيم NADH مع الحمض الأميني Val138 للإنزيم LDH حسب الشكل (أ) ولم يشارك هذا الحمض الأميني في التحفيز يؤكد أن حمض أميني يخص موقع التثبيت للموقع الفعال . ☜ يؤكسد مرافق الإنزيم NADH متخليا عن البروتون H^+ لكربون الركيزة بيروفات ليتحرر الناتج الأول NAD^+ . ☜ ارتباط Arg 109 بالركيزة بيروفات حسب الشكل (أ) ، ☜ و ارتباط Arg 171 المتأين بالركيزة بيروفات حسب الشكل (أ) ولم يشاركا هذان الحمضان الأمينيان في التحفيز يؤكد أن الحمضين Arg 171 و Arg 109 ينتميان الى موقع التثبيت للموقع الفعال . ☜ يتخلى الحمض الأميني المتأين His195 عن البروتون H^+ فيصبح الحمض غير متأين ليكتسبه أوكسجين الركيزة بيروفات فيتحرر الناتج الثاني اللاكتات ، فالحمض الأميني His195 خاص بموقع التحفيز للموقع الفعال . ☜ ليتفرغ الموقع الفعال للإنزيم LDH للقيام بالتفاعل الموالي .
1	0.125 8⋆	هذه النتائج تسمح لنا بشرح فاعلية الأنزيم عند pH = 13 و T°=80°c مقارنة بفاعليته عند درجة الحرارة والحموضة المثلى . ✍ عند الدرجات المثلى من درجة الحرارة [54-60°c] و درجة الحموضة pH=9 تبلغ نسبة نشاط الإنزيم القيمة الأعظمية في حدود 95 % ، يحافظ عندها الإنزيم على بنيته الفراغية الطبيعية التي تؤمنها الروابط الكيميائية (الهيدروجينية ، الكارهة للماء ، الشاردية و جسور ثنائية الكبريت) و خاصة الشكل الفراغي للموقع الفعال المحدد أساسا بمجموعة أحماض أمينية وهي : الخاصة بالتثبيت Arg. 171 ، Arg. 109 ، Val138 . والخاصة بالتحفيز His195 . والتي تحقق التخصص المزدوج للإنزيم . مما يسمح بحدوث تكامل بنيوي بينه وبين جزء من الركيزة و بالتالي:

0.625	0.125 5⋆	ضمان خاصية التثبيت للركيزة(بيروفات و NADH) ، يشكل المعقد (إنزيم-ركيزة) ، حدوث تفاعل التحفيز ، تحرير النواتج اللاكتات NAD^+ ، ومنه فاعلية الإنزيم LDH عند درجة الحرارة [54-60°c] المثلى والحموضة pH=9 المثلى .
0.875	0.125 7⋆	✍ كلما ابتعدنا عن مجال pH الأمثل ودرجة الحرارة المثلى تتناقص نسبة النشاط الإنزيمي حتى تنعدم حيث : عند pH=13 تغير الحالة الكهربائية للوظائف الأمينية و الحمضية لجذور الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الإنزيم خاصة بالموقع الفعال مما يسمح بفقدان البنية الفراغية للبروتين من خلال فقدان الروابط الشاردية التي تساهم في تحديد الشكل الفراغي للإنزيم عامة والموقع الفعال خاصة وبالتالي فقدان التخصص المزدوج للإنزيم .
0.625	0.125 5⋆	✓ حيث من خلال دراستنا لآلية عمل الإنزيم تبين أن الأحماض الأمينية Arg. 171 ، Arg. 109 ، Asp. 168 و His 195 أحماض أمينية متأينة فنجد الشحنة الإجمالية لإنزيم LDH موجبة (خاصة الموقع الفعال) عند درجة حموضة الوسط pH=9 أما عند تغيير pH الوسط الامثل 9 إلى pH=13 وسط جد قاعدي فتسلك الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الإنزيم سلوك الحمض فيكتسب الإنزيم شحنة إجمالية سالبة (خاصة الموقع الفعال) نفقد جذور الاحماض الأمينية القاعدية His 195 ; His109 /Arg171 بروتون H^+ ، كما تفقد الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني Asp168 بروتون H^+ ومنه فقدان الشكل الفراغي للموقع الفعال .
0.75	0.125 6⋆	عند درجة الحرارة 80°c تكسر الروابط الهيدروجينية خاصة التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للانزيم ومنه فقدان الشكل الفراغي للموقع الفعال . فتفقد خاصية التثبيت للركيزة بيروفات ، فلا يشكل المعقد (إنزيم-ركيزة) ، فقدان خاصية التحفيز ، عدم تحرير النواتج ، وبالتالي الإنزيم LDH يفقد فاعليته عند درجات الحرارة 80°c والحموضة pH=13 البعيدة عن الدرجات المثلى pH=9 و [54-60°c] .

التمرين الثالث (8 نقاط): ☺

الجزء الأول: باستغلالك للوثيقتين (1) و(2) : ☜ حدد المشكل العلمي ثم اقترح فرضية لحله .

0.875	0.125 7⋆	استغلال الوثيقة (1) توضح العلاقة الوظيفية بين الخلايا المناعية خلال الإستجابة المناعية النوعية حيث نجد الخطوات التالية : ☜ تعمل البالعة النسيجية على بلعمة المستضد وتهضمه هضما جزئيا مبقية على المحددات المستضدية بعملية البلعمة . ☜ تعرض البالعة النسيجية المحدد المستضدي على الجزيئتين الغشائيتين CMH I / CMH II ← عملية العرض. ☜ تعرض البالعة النسيجية المعقد (CMH I - البيتيد المستضدي) على غشاءها لتتحسس له الخلية LT8 بفضل التعرف المزدوج بين TCR8 والمعقد (CMH I - البيتيد المستضدي) ← عملية التحسيس . ☜ تعرض البالعة النسيجية المعقد (CMH II - البيتيد المستضدي) على غشاءها لتتحسس له الخلية LT4 بفضل التعرف المزدوج بين TCR4 والمعقد (CMH I - البيتيد المستضدي) ← عملية التحسيس . ☜ تتعرف الخلية LB مباشرة على المحددات المستضدية بفضل الجسم المضاد الغشائي BCR ← عملية التحسيس . ☜ كما يمكن للخلية LB أن تعرض على غشاءها المعقد (CMH II - البيتيد المستضدي) و تحسس الخلية LT4 ☜ تصبح الخلايا LB / LT8 / LT4 محسسة لنفس المستضد .

1.125	0.125 9⋆	☜ تفرز البالعة النسيجية المبلغ المناعي IL1 لتنشط الخلايا المحسسة لنفس المستضد ← عملية التنشيط . ☜ تركب الخلايا المحسسة و المنشطة مستقبلات غشائية نوعية للمبلغ المناعي IL2 لتصبح قادرة على التحفيز . ☜ تعمل الخلية LT4 على افراز المبلغ المناعي IL2 لتحفز نفسها على التكاثر والتمايز ← عملية التحفيز . ☜ بعد تكاثر الخلايا LT4 تتمايز الى خلايا LTh و LT4m . ☜ تركب و تفرز الخلايا LTh المبلغ المناعي IL2 لتحفز الخلايا المناعية المحسسة والمنشطة ☜ تتكاثر الخلايا LT8 و LB ثم تتمايز الى خلايا منفذة : ✍ الخلايا LB تتمايز الى الخلايا البلازمية LBP المنتجة للأجسام المضادة النوعية بالإضافة الى الخلايا الذاكرة LBm ← إنها الإستجابة المناعية الخلطية . ✍ الخلايا LT8 تتمايز الى الخلايا السامة LTC المنتجة للبرفورين الثاقب للخلايا المصابة بالإضافة الى الخلايا الذاكرة ← إنها الإستجابة المناعية الخلوية . ومنه نستنتج : وجود تعاون مناعي بين الخلايا المناعية البالعة LT4 و LT8 و LB عن طريق جزيئات مناعية فعالة لتحدث استجابة مناعية خلطية أو خلوية أو كليهما لإقصاء المستضد .
		التساؤل الذي يمكننا طرحه : ما العلاقة بين عمر فئات الذكور وتغيرات تركيز الزنك بمصل دمهم ؟؟؟
0.25	0.125 2⋆	☜ الإجابة تقدمها الوثيقة 2) تمثل العلاقة بين عمر الفئات وتركيز الزنك في مصل الدم لمجموعة من الذكور حيث نجد : ☜ بالنسبة لفئة الذكور 40> سنة : يبلغ تركيز عنصر الزنك بالمصل قيمة أعظمية تقدر بـ 85 µg/dl . ☜ بالنسبة لفئة الذكور 40 ≤ to < 50 سنة : يقل تركيز عنصر الزنك بالمصل بنسبة ضعيفة 84 µg/dl . ☜ كلما زاد عمر فئات الذكور من فئة لأخرى يتراوح سنهم في المجال 50 ≤ to ≥ 70 يقل تركيز عنصر الزنك بالمصل من 84 µg/dl إلى غاية تقريبا 78 µg/dl عند الفئات 70 ≤ سنة . ومنه نستنتج أن الأفراد المسنين الذكور يعانون من قلة تركيز الزنك بمصل دمهم مقارنة بفئة الشباب .
0.5	0.25	يمكننا من خلال هذه النتائج طرح المشكل العلمي التالي : كيف يؤثر نقص تركيز الزنك بمصل دم المسنين على نشاط الجزيئات المناعية الفعالة وبالتالي تراجع في فعالية جهازهم المناعي؟؟؟؟
	0.25	يمكننا اقتراح الفرضية التالية كحل للمشكل المطروح من خلال نتائج الوثيقة 1) : يؤثر نقص تركيز الزنك بمصل دم المسنين على نشاط الجزيئات المناعية الفعالة كمنع تركيب وعدم إفراز المبلغ الكيميائي IL2 وبالتالي لا تحفز الخلايا المناعية المحسسة والمنشطة فلا تتكاثر ولا تتمايز الى خلايا منفذة وبالتالي غياب الاستجابة المناعيتين الخلطية والخلوية ومنه تراجع في فعالية جهازهم المناعي .
		الجزء الثاني : ☺ للتأكد من صحة الفرضية تقدم الدراسات التالية : 🕮 باستغلالك للوثيقتين (3) و(4) :
		استغلال الشكل (1) من الوثيقة (3) يوضح العلاقة بين تغيرات نسبة الزنك بمصل دم الأفراد و نسبة التعبير المورثي للمورثتين (CREMα و IL2) بدلالة عمر الفئات المدروسة حيث نجد :
0.25	0.125 2⋆	☜ عند الفئة 1 الشباب : بلغت نسبة الزنك بمصل دمهم نسبة طبيعية تقدر بـ 90 µg/dl مقارنة بالمعدل الطبيعي . ونسبة التعبير المورثي داخل الخلايا اللمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى : بالنسبة للمورثة (CREMα) نشاطها عادي وبالنسبة للمورثة (IL2) نشاطها قوي وفعال . ومنه تركيب وافراز طبيعي وقوي للمبلغ الكيميائي IL2 المحفز للخلايا المناعية وبالتالي فعالية الجهاز المناعي لدى فئة الشباب .

0.25	0.125 2⋆	☜ عند الفئة 2 المسنين : بلغت نسبة الزنك بمصل دمهم نسبة ضعيفة تقدر بـ 60 µg/dl > مقارنة بالمعدل الطبيعي . ونسبة التعبير المورثي داخل الخلايا اللمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى : بالنسبة للمورثة (CREMα) ارتفاع نشاطها أصبح عالي جدا وبالنسبة للمورثة (IL2) انخفاض أو كبح نشاطها أصبح ضعيف جدا . ومنه عدم تركيب وعدم افراز المبلغ الكيميائي IL2 وبالتالي تراجع فعالية الجهاز المناعي لدى فئة المسنين .
0.25	0.125 2⋆	☜ عند الفئة 3 المسنين المعالجين : ارتفعت نسبة الزنك بمصل دمهم نسبة طبيعية تقدر بـ 70 ≤ µg/dl مقارنة بالفئة 2 مسنين غير معالجين . ونسبة التعبير المورثي داخل الخلايا اللمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى : بالنسبة للمورثة (CREMα) استعادت نشاطها العادي وبالنسبة للمورثة (IL2) استعادة نشاطها وأصبحت قوية وفعالة . ومنه إعادة تركيب وافراز طبيعي وقوي للمبلغ الكيميائي IL2 المحفز للخلايا المناعية وبالتالي استرجاع فعالية الجهاز المناعي لدى فئة المسنين المعالجين بالمكمل الغذائي .
0.5	0.125 4⋆	ومنه نستنتج أن : أن نقص الزنك عند المسنين ينشط التعبير المورثي للمورثة CREMα وهو بدوره يثبط التعبير المورثي للمورثة IL2 ويقلل من فعالية الجهاز المناعي . يمكن علاج المسنين بتناولهم مكمل غذائي مزود بالزنك.
فكيف يتم ذلك ؟؟؟؟		الإجابة تقدمها الوثيقة (3) الشكل (2) .
1.625	0.125 13⋆	استغلال الشكل (2) الوثيقة (3) يمثل رسما تخطيطيا لخلية لمفاوية تائية أثناء استجابتها لمحفز العدوى لفرد مسن غير معالج من الفئة 2 حيث نجد : أثناء نقص الزنك بمصل دم الفئة المسنة غير المعالجة يحدث تدفق داخلي لزنك داخل الخلية اللمفاوية التائية LT4 فيحدث التأثير 1 : يمارس على المورثة CREMα فتكثف عملية النسخ للمورثة (عالية جدا) ، فنحصل على عدة جزيئات ARNm الخاصة بـ CREMα على مستوى نواة الخلية. تنتقل جزيئات ARNm عبر الثقوب النووية الى الهيولى ليتم ترجمتها ، تركب عدة جزيئات بروتينية CREMα . يحدث التأثير 2 :يمارس على المورثة IL2 بتأثير الكمية الكبيرة لبروتين CREMα فيثبط التعبير المورثي لها فلا يركب ولا يفرز المبلغ IL2 .
	0.125	ومنه نستنتج أن نقص الزنك بالخلايا اللمفاوية التائية LT4 يثبط التعبير المورثي للمورثة IL2 فلا يركب ولا يفرز IL2.
0.75	0.125 6⋆ 12) البيان تقسم على 2)	☜ هذه النتائج تسمح لنا بتوضيح سبب تراجع فعالية الجهاز المناعي عند المسنين حيث يرجع السبب إلى نقص العنصر المعدني الزنك بدم الأفراد المسنين ،حيث : - بعد تدفقه الداخلي إلى الخلايا اللمفاوية التائية LT4 بكمية قليلة ، - يحدث التأثير الأول على المورثة CREMα - ليتم تكثيف تعبيرها الوراثي ، تكثيف نسخها الى عدة جزيئات ARNm . - ينقل ARNm الى الهيولى أين يتم تكثيف ترجمته الى عدة جزيئات بروتينية من نوع CREMα - يحدث التأثير الثاني على المورثة IL2 بتأثير من البروتين CREMα

		ـ يثبط تعبيرها الوراثي لا تستنسخ ولا تترجم فيقل افراز الكبير للمبلغ الكيميائي IL2 من طرف الخلية اللمفاوية التائية LT4 . ـ لا يحدث تحفيز ذاتي للخلايا LT4 ـ لا تظهر الخلايا LTh ـ غياب التحفيز للخلايا LB و LT8 ومنه غياب الخلايا المنفذة LBp و LTc . ـ فتتوقف الإستجابتين المناعيتين الخلطية والخلوية معا وهذا ما يفسر تراجع فعالية الجهاز المناعي بسبب حدوث خلل في العلاقة بين الجزيئات البروتينية المناعية الفاعلة (IL2) ونقص العنصر المعدني الزنك . ومنه هذه النتائج تسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة .
☜2- علل استعمال المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات يحتوي على الزنك خلال الإصابة بفيروس SARS-COV2 باستغلال الوثيقة (4) تمثل رسما تخطيطيا يوضح أهمية وصف المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات به معدن الزنك للمرضى بعد إصابتهم بفيروس SARS-COV2 فنجد :		
0.25	0.25	عدة طرق لتأثير الزنك بعد الإصابة بفيروس SARS ـ COV2 وهي : ① ← تثبت ذرة الزنك على المستقبل الغشائي ACE2 فيمنع تثبيت فيروس SARS ـ COV2 على مستقبله الغشائي على الخلية المستهدفة ACE2 . ② ← يثبط الزنك عمل انزيم النسخ العكسي للفيروس أو يثبط عمل انزيم ARN بوليميراز. ③ ← يعمل الزنك على تفكيك المادة الوراثية الفيروسية . ④ ← ينشط الزنك بتراكيزه الطبيعية خلايا البالعات النسيجية و اللمفاوية التائية. ومنه نستنتج أن الزنك عنصر معدني فعال يساهم في القضاء على الفيروس SARS ـ COV2 دخل العضوية المصابة .
0.25	0.25	هذه النتائج تسمح لنا بتعليل سبب استعمال المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات يحتوي على الزنك خلال الإصابة بفيروس SARS-COV2 إذ يساهم في : ـ منع دخول الفيروس الى هيولة الخلايا المستهدفة من خلال الخطوة ① . ـ تثبيط نشاط الانزيمات النسخ العكسي للفيروس و وانزيم ARN بوليميراز وتفكيك مادته الوراثية وبالتالي منع تكاثر الفيروس داخل الخلايا المستهدفة الخطوتين ② و ③. ـ تنشيط الخلايا المناعية منها خلايا البالعات النسيجية و اللمفاوية التائية LT4 حتى يتم تأدية وظائفهما الأساسية وهي : البلعمة ، العرض ، التحسيس ، التنشيط بـ IL1 و التحفيز بـ IL2. لتحدث الاستجابتين المناعيتين الخلطية والخلوية معا ومنه رفع فعالية الجهاز المناعي لدى الأفراد المصابين منهم المسنين وبالتالي تسهيل القضاء على مختلف الفيروسات منها SARS ـ COV2 .

الجزء الثالث : مخطط يوضح سبب العجز المناعي عند المسنين من خلال ما سبق ومعلوماتك.



01